COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABÉTIQUES.

JANVIER — JUIN 1866.

TABLE DES MATIÈRES DU TOME LXII.

A

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

PRIX PROPOSÉS.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

SCIENCES PHYSIQUES.

S

T

Voir aussi l'article *Chirurgie*.

U

V

Z

TABLE DES AUTEURS.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

ERRATA.

(Séance du 26 février 1866. — T. LXII, p. 408.)

Dans le Tableau des caractéristiques des systèmes de surfaces du second ordre, les deux classes de systèmes $(K\theta,\ 5Z)$, et $(\widehat{G, G'},\ 3Z)$, annoncées comme exemples de conditions triples et quintuples (p. 406 et 407), ont été omises par inadvertance. Les voici :

$(\widehat{G, G'},\ 3p\ ) \equiv (1,\ 2,\ 2),$

$(\widehat{G, G'},\ 2p,\ 1P) \equiv (2,\ 4,\ 2).$

$(\widehat{G, G'},\ 1p,\ 2P) \equiv (2,\ 4,\ 2),$

$(\widehat{G, G'},\ 3P) \equiv (2,\ 2,\ 1),$

$(\widehat{G, G'},\ 2p,\ 1d\ ) \equiv (2,\ 4,\ 4),$

$(\widehat{G, G'},\ 1p,\ 2d\ ) \equiv (4,\ 8,\ 8),$

$(\widehat{G, G'},\ 3d\ ) \equiv (8,\ 8,\ 8),$

$(\widehat{G, G'},\ 2d,\ 1P) \equiv (8,\ 8,\ 4),$

$(\widehat{G, G'},\ 1d,\ 2P) \equiv (4,\ 4,\ 2),$

$(\widehat{G, G'},\ 1p,\ 1d,\ 1P) \equiv (4,\ 8,\ 4),$

$(K\theta,\ 5p\ ) \equiv (1,\ 2,\ 3),$

$(K\theta,\ 4p,\ 1d\ ) \equiv (2,\ 4,\ 6),$

$(K\theta,\ 3p,\ 2d\ ) \equiv (4,\ 8,\ 12),$

$(K\theta,\ 2p,\ 3d\ ) \equiv (8,\ 12,\ 16),$

$(K\theta,\ 1p,\ 4d\ ) \equiv (12,\ 14,\ 16),$

$(K\theta,\ 5d\ ) \equiv (14,\ 14,\ 14),$

$(K\theta,\ 4p,\ 1P) \equiv (3,\ 6,\ 6),$

$(K\theta,\ 3p,\ 2P) \equiv (6,\ 12,\ 8),$

$(K\theta,\ 2p,\ 3P) \equiv (8,\ 12,\ 6),$

$(K\theta,\ 1p,\ 4P) \equiv (6,\ 6,\ 3),$

$(K\theta,\ 5P) \equiv (3,\ 2,\ 1),$

$(K\theta,\ 3p,\ 1d,\ 1P) \equiv (6,\ 12,\ 12),$

$(K\theta,\ 2p,\ 2d,\ 1P) \equiv (12,\ 16,\ 16),$

$(K\theta,\ 1p,\ 3d,\ 1P) \equiv (16,\ 16,\ 16),$

$(K\theta,\ 4d,\ 1P) \equiv (16,\ 14,\ 12),$

$(K\theta,\ 2p,\ 1d,\ 2P) \equiv (12,\ 16,\ 12),$

$(K\theta,\ 1p,\ 2d,\ 2P) \equiv (16,\ 16,\ 12),$

$(K\theta,\ 3d,\ 2P) \equiv (16,\ 12,\ 8),$

$(K\theta,\ 1p,\ 1d,\ 3P) \equiv (12,\ 12,\ 6),$

$(K\theta,\ 2d,\ 3P) \equiv (12,\ 8,\ 4),$

$(K\theta,\ 1d,\ 4P) \equiv (6,\ 4,\ 2).$

Page 408, 1re colonne, ligne 4, en remontant, *au lieu de* $(K\theta,\ K'\theta',\ 2p,\ 1d)$, *lisez* $(K\theta,\ K'\theta',\ 1p,\ 1d)$.

Page 408, ligne 3, en remontant, *au lieu de* (2, 4, 2), *lisez* (2, 2, 2).

(Séance du 11 juin 1866. — T. LXII.)

Tableau des données numériques, etc., par M. L. Élie de Beaumont.

Page 1260, ligne 10 du tableau, *au lieu de* L = 51° 12′ 28″,23, *lisez* L = 51° 2′ 28″,23.

Page 1260, ligne 24 du tableau, *au lieu de* TT *bb* Hécla, *lisez* TT *bbc* Hécla.

Page 1261, ligne 15 du tableau, *au lieu de* TT *bb* Hécla, *lisez* TT *bbc* Hécla.

Page 1261, ligne 16 du tableau, *au lieu de* P = 20, *lisez* P = 24.

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.
Paris. — Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut.